

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DU NORD-OUEST - Arras - Tél. 23.14

(SEINE-MARITIME, SOMME, PAS-DE-CALAIS, NORD)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, - Station d'Alertes Agricoles d'ARRAS.
C. C. P. : LILLE 57-01-67

ABONNEMENT ANNUEL

15 F
Supplément n° 2
N° XLIV - 28 Mai 1964

AVERTISSEMENTS

MILDIOU DE LA POMME DE TERRE

GRANDES CULTURES

Les températures élevées du mois de Mai peuvent entraîner un départ précoce du Mildiou dans les régions où l'humidité a été suffisante (en particulier, régions littorales, et zones touchées par les dernières pluies orageuses).

Une cause aggravante de ce risque est la présence de nombreux tas de déchets ou restes de silos dans les Flandres en particulier.

Bien que les conditions ne semblent pas encore réunies pour que l'on assiste à une évolution généralisée de la maladie, il est possible que des pluies survenant début-Juin provoquent l'apparition des premiers foyers dans des situations très favorables au champignon.

Dans les cultures déjà bien avancées en végétation, il semble donc prudent de ne prendre aucun risque.

En conséquence, dans les situations sensibles (cultures couvrant les lignes, eau ayant stagné entre les buttes, champs mal aérés, proximité de tas de déchets, cultures maraîchères, etc.) et particulièrement dans une zone située à l'ouest d'une ligne DUNKERQUE-ABBEVILLE-ROUEN, il est conseillé d'appliquer un 1er traitement fongicide du 30 Mai au 1er Juin (retarder l'opération en cas de beau temps stable, mais intervenir avant les pluies).

REMARQUE - Ce 1er traitement est une opération d'assurance et il ne faut pas renouveler l'intervention avant un prochain avis de la Station.

CONCOURS MILDIOU

Il est rappelé que tous les renseignements que vous pourriez nous communiquer, nous sont très précieux. Les personnes qui nous adresseront les premiers échantillons de feuilles de pommes de terre atteintes de Mildiou, bénéficieront d'un abonnement gratuit pour 1965.

- Placer les feuilles suspectes entre 2 burcards humides (sans entourer de plastique)
- joindre une note avec nom, adresse, lieu du prélèvement, date du prélèvement, variété, date de plantation, situation de la culture ou du tas de déchets (bas-fond, plateau aéré...)

BETTERAVES

Un traitement bien appliqué suivant notre dernière note a généralement suffi pour enrayer les attaques de Pégomye et de pucerons noirs, et les betteraves plus fortes deviennent maintenant moins sensibles. Un renouvellement ne se justifie que dans des cas particuliers mais la surveillance des champs doit être poursuivie.

COLZAS DE PRINTEMPS

Les méligèthes vont envahir de plus en plus les cultures. Les dégâts les plus graves se font très tôt, en début de montaison, lorsque les boutons floraux sont encore à moitié enfouis. Bien surveiller les champs et intervenir dès que l'on constate plus de 3-4 méligèthes par bouton.

POIS DE CONSERVE

Dans la Vallée de la Lys et les Flandres, le vol des cécidomyies des fleurs a eu lieu (avortement des fleurs qui se transforment en galles). Les Thrips apparaissent. Un traitement immédiat sur les variétés en tout début de floraison permettrait de limiter ces dégâts (employer un produit de contact polyvalent - ex : Dieldrine + Parathion etc...)

TAVELURES DES FRUITS A PEPINS

CULTURES FRUITIERES

Appliquer un nouveau traitement du 2 au 4 Juin.

OLDIUM : Poursuivre une protection soignée.

PUCERONS - ACARIENS : Rappel : emploi d'un systémique.

Le Contrôleur : R. DIVOUX

L'Inspecteur : P. COUTURIER